

**総合殺虫殺菌剤を選ぶなら「硫黄」の力！**

# 海野 石灰硫黄合剤



**18ℓ**



**10ℓ**

## 特 徴

- ★カイガラムシ類や越冬病害虫などの防除剤として幅広く効果があります。  
(詳しくはラベルをお読み下さい。)
- ★石灰硫黄合剤は自然界に存在する「石灰」と「硫黄」だけですので、  
ポジティブリスト制の対象外となります。

## 使用方法

- ★ 秋冬から春先にかけて、作物が発芽する前に散布しましょう。
- ★ 前年から越冬した病害虫の防除が出来ます。

販売：  **海野薬品株式会社**

# 海野 石灰硫黄合剤

成分：多硫化カルシウム………27.5%  
 （全硫化態硫黄として………22.0%）  
 水等………72.5%  
 毒性：普通物

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	石灰硫黄合剤を含む農薬の総使用回数
みかん	ハダニ類・そうか病・黒点病	80~200倍 冬期20~40倍	-	-	散布	-
	かいよう病		発芽前			
	ヤノカイガラムシ	60~80倍 (硫酸亜鉛加用)	-			
りんご	腐らん病	10倍	休眠期			
	モリニア病・うどんこ病	40~140倍	-			
	黒星病	7倍	発芽前			
もも	縮葉病・胴枯病・黒星病					
うめ	縮葉病	8倍				
すもも・あんず	ふくろみ病	140倍	-			
なし	黒星病	7倍	発芽前			
果樹類	ハダニ類・サビダニ類	80~200倍	夏期			
		20~40倍	冬期			
落葉果樹	カイガラムシ類	7倍~10倍	発芽前			
	ハダニ類・越冬病害虫	7倍~40倍				
くり	芽枯病	20~40倍				
まつ	ハダニ類	20倍	新梢発生前			
かき	黒星病・うどんこ病	100倍	-			
びやくしん	赤星病	40倍				
麦類	赤かび病	50~60倍				
	さび病・うどんこ病	40~140倍				
茶	ハダニ類	80~200倍	夏期			
		20~200倍	冬期			
	サビダニ類	80~200倍	夏期			
		20~40倍	冬期			
桑	カイガラムシ類	7倍~10倍	発芽前			
	胴枯病	7倍				
すぐり	うどんこ病	80~140倍	-			

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	石灰硫黄合剤を含む農薬の総使用回数
りんご	摘花	100~120倍	満開後	2回	立木全面散布	-

## 【使用上の注意事項】

- ★ 保護眼鏡をつけましょう。
- ★ 農薬散布用マスクをつけましょう。
- ★ 作業用ゴム手袋をつけましょう。
- ★ 保護衣を着用しましょう。
- ★ 石灰硫黄合剤が長時間皮膚に触れていると、火傷のような症状になることがあります。  
万一の場合は速やかに医師の診察を受けて下さい。
- ★ 近隣への飛散に注意しましょう。
- ★ 車などにかからないようにして下さい。万一かかった場合は、すぐに水で洗い流して下さい。
- ★ 0℃以下では結晶の恐れがありますので、保管に注意して下さい。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベル記載以外には使用しないでください。

●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理して下さい。

この印刷物の内容は、2021年11月現在のものです。

製造：海野製薬株式会社

長野市篠ノ井小森460